

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé sont tenus de déclarer toute suspicion d'effet secondaire nouveau ou grave. Voir la rubrique «Effets indésirables» pour les modalités de déclaration des effets secondaires.

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

## Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre

### Qu'est-ce que Sérum autologue Blutspende Zürich, collyre et quand doit-il être utilisé?

Les collyres Sérum autolog Blutspende Zürich sont préparés à partir du sang du patient sur prescription de l'ophtalmologue.

Les collyres à base de sérum autologue Blutspende Zürich sont indiqués pour le traitement de la sécheresse oculaire (kératoconjonctivite sèche) chez les patients âgés de 18 ans et plus qui ne parviennent pas à soulager leurs symptômes avec un autre traitement autorisé.

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Les collyres Sérum autolog Blutspende Zürich se conservent au congélateur à une température maximale de -15 °C pendant 6 mois. Une fois décongelés, ils se conservent au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 24 heures.

Une fois la date de péremption dépassée, les collyres Sérum autolog Blutspende Zürich ne doivent plus être utilisés.

En cas d'utilisation simultanée d'autres médicaments ophtalmiques, il convient de consulter l'ophtalmologue traitant. Un intervalle d'au moins 15 minutes doit être respecté entre les différentes applications de collyre.

### Remarque pour les porteurs de lentilles de contact

Il n'existe pas de données fiables concernant l'utilisation des collyres Sérum autolog Blutspende Zürich chez les porteurs de lentilles de contact.

L'application des collyres Sérum autolog Blutspende Zürich n'est pas recommandée pendant le port de lentilles de contact.

### Quand Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre ne doit-il pas être pris/utilisé?

Vous ne devez pas utiliser les collyres Sérum autolog Blutspende Zürich si vous souffrez de syphilis, d'hépatite B, d'hépatite C ou d'une infection par le VIH. Vous ne devez pas non plus utiliser ces collyres en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients des collyres, en cas de conjonctivite infectieuse ou de kératite infectieuse.

Vous ne devez pas utiliser Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre si vous souffrez d'une anémie grave ou non traitée.

Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre ne doit être utilisés que par le patient ou la patiente dont le sang a servi à leur fabrication. D'autres personnes ne doivent pas utiliser Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre. Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre sont étiquetés au nom du patient sur chaque flacon d'ophtiole (collyre).

### Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l'utilisation de Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre?

Avant d'utiliser les collyres, assurez-vous que le contenu est limpide, c'est-à-dire qu'il n'est pas trouble et qu'aucun précipité n'est visible. Si de tels changements sont néanmoins perceptibles ou si les gouttes provoquent une sensation de brûlure dans les yeux, signalez ces incidents au médecin traitant. Le flacon concerné ne doit pas être jeté, mais renvoyé au service de transfusion sanguine pour un examen plus approfondi.

Veillez informer votre médecin si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage ophtalmique!) (même en automédication!).

À ce jour, rien n'indique que l'utilisation de Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre, altère l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines. Cependant, comme une vision trouble peut survenir après l'utilisation de Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre, vous ne devez reprendre le volant ou utiliser des machines que lorsque vous voyez à nouveau clairement.

### Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Il n'existe pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes ou allaitantes. C'est pourquoi les collyres Sérum autolog Blutspende Zürich ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse et l'allaitement.

### Comment utiliser Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre?

La fréquence d'utilisation est déterminée par le médecin traitant.

La durée du traitement est déterminée par le médecin traitant. En règle générale, une goutte est instillée dans le sac conjonctival inférieur de l'œil concerné, de 3 fois par jour à une fois par heure au maximum.

Avant d'utiliser les collyres, vous devez vous laver soigneusement les mains avec du savon. Savonnez-vous soigneusement toutes les parties de vos mains (y compris les poches, les espaces entre les doigts, le dos des mains et les ongles) pendant au moins 30 secondes. Séchez-vous les mains avec une serviette propre et sèche, puis désinfectez-les avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool.

Ne prélevez qu'un seul ophtiole à la fois de l'emballage.

Avant l'utilisation, vérifiez sur l'étiquette de l'ophtiole que vos données personnelles (nom, prénom, date de naissance) sont correctes. Si le produit ne vous est pas destiné, l'ophtiole ne doit en aucun cas être utilisée!

Laissez décongeler l'ophtiole dans votre main.

Ouverture : Tenez l'ophtiole sous le capuchon avec une main et ouvrez le bouchon avec l'autre main en le tournant légèrement. Lors de l'ouverture, n'appuyez pas sur la partie remplie de liquide et ne pliez pas le capuchon (voir illustration 1).

Illustration 1: Comment ouvrir l'ophtiole?



1. Tenez le flacon par le dessous du bouchon avec une main...



2. ...utilisez votre autre main pour desserrer le couvercle en le tournant...




3. ... puis tirez vers le haut.

Utilisation: Retournez l'ophtiole et placez-le tout près du coin interne de l'œil. Appuyez ensuite délicatement avec vos doigts sur le flacon et instillez une goutte dans le coin interne de l'œil concerné. Si une goutte s'écoule accidentellement de l'œil, vous pouvez instiller une autre goutte dans le coin de l'œil. Veillez à ne pas toucher l'ouverture de l'ophtiole et à ce que n'entre pas en contact avec une surface, car cela pourrait entraîner une contamination des gouttes ophtalmiques.



Ne pas appuyer sur la partie contenant le liquide du flacon lors de l'ouverture...



... et ne pliez pas le bouchon.

Illustration 2: Comment refermer l'ophtiole?



Fermeture: l'ophtiole doit être bien refermé immédiatement après utilisation. Fermez l'ophtiole en plaçant et en enfonçant le bouchon (voir illustration 2) et conservez-le au réfrigérateur entre 2 et 8 °C jusqu'à la prochaine utilisation, sans dépasser 24 heures.

Pour fermer, placez le capuchon dessus puis faites-le glisser à l'intérieur.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre ophtalmologue ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Si l'application des collyres Serum autolog Blutspende Zürich est effectuée par une autre personne, celle-ci doit impérativement porter des gants médicaux pour sa propre protection.

#### Quels effets secondaires Serum autolog Blutspende Zürich, collyre peut-il provoquer?

*Fréquent (concerne 1 à 10 patients sur 100)*

Immédiatement après l'administration, une sensation désagréable d'irritation et de brûlure, une sensation de paupières collées et une vision trouble peuvent apparaître. Ces effets sont passagers et n'ont pas de conséquences à long terme.

*Rare (concerne 1 à 10 patients sur 10'000)*

Les effets indésirables suivants ont été rapportés lors d'études cliniques : eczéma des paupières, vascularite sclérale et lyse en cas de polyarthrite rhumatoïde, dépôts d'immunoglobulines dans la cornée, infiltrats cornéens périphériques, infection oculaire pendant le traitement par collyre due à un flacon contaminé.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

#### À quoi faut-il encore faire attention?

*Durée de conservation*

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le l'emballage.

*Délai d'utilisation après ouverture (décongélation)*

Se conserve 24 heures au réfrigérateur (2-8 °C) après décongélation.

Si le contenu de l'ophtiole n'est pas entièrement utilisé, l'ophtiole entamée doit être jetée au bout de 24 heures.

*Remarques concernant la conservation*

Conserver au congélateur (en dessous de -15°C). Après décongélation, conserver au réfrigérateur (2-8 °C).

Conserver dans l'emballage d'origine.

Garder le récipient bien fermé.

Conserver hors de portée des enfants

*Remarques concernant la manipulation*

Avant utilisation, l'ophtiole doit être décongelée lentement dans la main, en aucun cas dans de l'eau chaude ou au micro-ondes.

Afin de ne pas compromettre la stérilité des collyres, l'embout de l'ophtiole ne doit pas entrer en contact avec les mains, les yeux ou d'autres objets.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre ophtalmologue, qui dispose d'une information détaillée destinée aux professionnels Mention concernant l'élimination

Ne jetez jamais de médicaments dans les eaux usées ou avec les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou dont vous n'avez plus besoin peuvent être déposés dans les pharmacies ou les points de collecte. Ces mesures contribuent à la protection de l'environnement.

#### Que contient Sérum autolog Blutspende Zürich, collyre?

*Principes actifs*

Sérum humain autologue

*Excipients*

Aucun

#### Numéro d'autorisation

68573 (Swissmedic)

#### Où obtenez-vous Sérum autolog Blutspende Zurich, collyre ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

Il s'agit d'un médicament spécifique au patient, disponible uniquement sur ordonnance médicale.

Il existe des conditionnements de 30 ophtioles.

Un ophtiole contient 1,0 à 1,5 ml de Sérum autolog Blutspende Zurich, collyre.

Le nombre de conditionnements dépend du volume de sang prélevé.

#### Titulaire de l'autorisation

Stiftung Zürcher Blutspendedienst SRK, Zurich

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).